LES 13 COMMANDEMENTS DU NAISSEUR

PRÉVENTION DE LA MORTALITÉ DES AGNEAUX EN 13 ÉTAPES

Par Dr Gaston Rioux, coordonnateur en santé. CEPOQ

ÉTAPES	ACTIONS	RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
1 Tarissement adéquat des brebis	♦ Consultez la fiche du système mammaire disponible sur le site Internet du CEPOQ. **www.cepoq.com**	✸ +++ litière adéquate, vérification des pis 7 jours après le tarissement.
2 Sélection des béliers	♦ Examen du système reproducteur, santé adéquate, bonne preparation (contre-saison) ♦ Tester et prévenir contre certains type d'avortements ♦ Vérifier l'état de chair ♦ Taux de vitamine E-Se et A-D adéquat	✸ Bonne sélection de croisement selon le groupe à accoupler.
3 Sélection des brebis pour l'accouplement (ÉTAPE TRÈS IMPORTANTE)	♦ Vérifier l'état de santé général, pis parfait ♦ Vérifier état de chair, vit. E-Se, et A-D ♦ Re-conditionner les brebis maigres, mais en santé	✸ Croisement désiré Réformer toute brebis non-conforme et malade ou avec un pis peu adéquat.
4 Accouplement	♦ Flushing ♦ Photopériode, CIDR, etc. ♦ Grouper par lots uniformes étalés sur l'année	✸ Agnelages regroupés = meilleure surveillance Étalement de la production = meilleure productivité
5 Prévention des avortements (si nécessaire)	♦ Cibler la cause des avortements: Chlamydophilose, campylobactériose, toxoplasmose, fièvre Q, etc.	✸ Ajuster la prévention selon le type d'avortement.
6 Échographie	♦ Échographie 60 jours après l'accouplement environ	✸ Grouper les brebis selon leur stade de gestation. Remettre à l'accouplement les brebis non-gestantes ou réformer les infertiles

ÉTAPES	ACTIONS	RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
7 **Alimentation optimale**	♦ Programme alimentaire personnalisé selon l'entreprise	Tout stade de gestation ou de lactation requiert une alimentation adaptée.
8 **Fin de gestation (+++ important)**	♦ Régie stricte de l'alimentation (+) ♦ Niveau adéquat de vit. E-Se et AD ♦ Vaccins (entérotoxémie - tétanos) ♦ Parage des onglons ♦ Tonte ♦ Vermifuger si nécessaire	Selon les problèmes rencontrés et diagnostiqués dans l'élevage : • Des vaccins peuvent être utilises • La prévention contre les avortements complétée
9 **JOUR 0 (agnelage) + +**	♦ Surveillance des brebis (pis proper) ♦ Milieu adéquat (+ +); litière abondante ♦ Case d'agnelage	C'est la journée la plus importante dans la vie d'un nouveau-né. C'est à ce moment qu'il faut mettre le plus d'efforts possibles.
10 **Soins au nouveau-né**	♦ Désinfection du nombril ♦ Colostrum en quantité et qualité suffisante ♦ Injection de vit E-Se, A-D ♦ Prévenir l'hypothermie (temperature et humidité)	Colostrum : 210 ml/kg de poids vif pour les 18 premières heures de vie Nombril : iode 4 %
11 **Jours 0-2**	♦ Milieu adéquat (propre, litière abondante) ♦ Vérifier la prise de lait ♦ Identification lorsque l'agneau est sec	C'est l'hypothermie et le manque de lait qui sont les plus graves problèmes à cette période de vie.
12 **Jours 2-10**	♦ Attention aux infections !!! ♦ Surveiller la prise de lait ♦ Débuter les dérobées ♦ Fournir de l'eau aux agneaux	Principales conditions à surveiller : • Pneumonies • Arthrites • Diarrhées
13 **Jour 10 au sevrage**	♦ Grouper les brebis selon l'âge des agneaux ♦ Début de la prévention contre la coccidiose ♦ Surveiller la prise de lait ♦ Continuer les dérobées ♦ Fournir de l'eau aux agneaux	Principaux problèmes : • Pneumonies • Arthrites • Diarrhées