NOM DE LA FERME : _____

Date : _____

Arthrite encéphalite caprine

Programme Québécois d'Assainissement des Troupeaux Caprins pour l'AEC

Vérification du Respect des Règles de BIOSÉCURITÉ pour les participants au Programme

Légende : **R =** *recommandé* **O =** *obligatoire*

Règles de biosécurité *Veuillez cocher votre Statut :*	**Troupeau inscrit** ☐	**Statut *Argent*** ☐	**Statut *Or (Diamant)*** ☐	**Cochez si la règle est respectée depuis au moins 4 mois**
1. BÂTIMENTS ET PÂTURAGES				
1.1 Chèvrerie				
Les caprins positifs et négatifs sont gardés dans des bâtiments différents séparés.	**R**	**O**	**O**	☐
Si la séparation dans des bâtiments différents est impossible, les caprins sont gardés dans le même bâtiment, dans un local séparé, fermé de préférence par une porte et des murs.	**R**	**O**	**O**	☐
Si ces deux options sont impossibles, les animaux sont gardés dans le même bâtiment, avec des séparations pleines (non ajourées) entre les lots.	**R**	**O**	**O**	☐
1.2 Accès à la chèvrerie				
Les visiteurs de l'extérieur de la ferme qui doivent avoir accès au troupeau doivent porter des survêtements et des bottes propres qui n'ont pas été exposés à des chèvres de statut inférieur. Les survêtements doivent être fraîchement lavés.	**R**	**R**	**R**	☐
Il faut laver à fond les bottes de caoutchouc avec un savon désinfectant avant de pénétrer dans la bergerie. Des bottes de cuir peuvent être portées à l'intérieur de bottes de caoutchouc propres ou être recouvertes de bottes de plastiques jetables.	**R**	**O**	**O**	☐
La porte de la chèvrerie porte l'inscription : « Défense d'entrer sans autorisation du responsable de la ferme ».	**R**	**O**	**O**	☐
La chèvrerie négative est toujours visitée avant la chèvrerie positive.	**R**	**O**	**O**	☐
1.3 Pâturage				
Les caprins positifs et négatifs ne sont pas dans le même pâturage.	**R**	**O**	**O**	☐
Les clôtures sont érigées de façon à empêcher tout contact physique direct entre les caprins positifs et négatifs (clôture pleine ou 5 m minimum entre 2 clôtures).	**R**	**O**	**O**	☐

2. ÉQUIPEMENT					
	Tout équipement (trayeuse, nourrisseur, mangeoire, abreuvoir, pince à tatouer, tracteur, etc.) n'est pas partagé entre les animaux de la quarantaine et ceux négatifs. S'ils doivent être partagés, ils sont d'abord utilisés dans le troupeau négatif OU désinfectés avant d'être utilisé ou réutilisé de nouveau dans le troupeau négatif.	**R**	**O**	**O**	☐
	Les chèvres sont traites dans un ordre minimisant les risques de transmission du virus : En premier = chèvres négatives En second = chèvres en quarantaine Finalement = chèvres positives	**R**	**O**	**O**	☐
	Des aiguilles à usage unique doivent être utilisées pour les injections (seringues et seringues à doses multiples) ou prélèvements (seringues et seringues automatiques à doses multiples). Une aiguille ne doit pas être réutilisée sur un autre animal. Toujours utiliser une aiguille stérile lorsque l'on retire des médicaments d'une bouteille.	**R**	**O**	**O**	☐
3. MOUVEMENT D'ANIMAUX					
	Les caprins en provenance d'un autre troupeau sont mis en quarantaine et testés avant leur introduction dans le troupeau (section 4.5).	**R**	**O**	**O**	☐
	Les caprins ayant des contacts directs avec d'autres caprins de statut inférieur ou inconnu (lors d'exposition par exemple) sont mis en quarantaine à leur retour.	**R**	**O**	**O**	☐
	Tous les caprins introduits dans le troupeau sont inscrits dans les registres.	**R**	**O**	**O**	☐
	Le transport des animaux se fait de façon à éviter tout contact avec d'autres caprins ou ovins positifs ou de statut inconnu, incluant les endroits où les caprins devront être déchargés durant le trajet.	**R**	**O**	**O**	☐
	Lors d'exposition, les caprins négatifs sont logés dans un parc séparé des autres caprins et ovins de statut inconnu de façon à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de contact direct (ex : par des nourrisseurs, des abreuvoirs, des contacts à travers les enclos, etc.)	**R**	**O**	**O**	☐
4. ÉLEVAGE					
	Les animaux négatifs sont traités avant les animaux de la quarantaine.	**R**	**O**	**O**	☐
	Toutes les manipulations doivent se faire dans l'objectif de ne pas contaminer le troupeau négatif, que ce soit avec du matériel, des vêtements, les mains et les bottes de travail.	**R**	**O**	**O**	☐
6. REPRODUCTION					
	Le sperme (frais ou congelé) utilisé dans le cadre des programmes d'insémination artificielle doit être prélevé dans un centre d'IA agréé par le fédéral (à la condition que ces boucs aient eu au moins 1 test AEC négatif avant le prélèvement de l'échantillon de sperme).	**R**	**O**	**O**	☐
	On tient compte des résultats de la mère génétique (donneuse) dans les cas de collecte et de transfert d'embryons, et à la condition que les embryons aient été traités conformément au protocole établi par l'International Embryo Transfer Society concernant la manutention sanitaire des embryons[1].	**R**	**O**	**O**	☐

[1] Manuel de l'International Embryo Transfer Society. Troisième édition. 1998. Ed. DA Stringfellow and SM Seidel. International Embryo Transfer Society. Champaign, Illinois.

7. AUTRES				
7.1 Fumier				
Les chèvres ne doivent pas avoir accès au fumier des chèvres de statut inférieur à moins que ce fumier ait été vieilli au moins 15 jours sans contact possible avec des chèvres de statut inférieur.	**R**	**O**	**O**	☐
7.2 Lutte contre les insectes et la vermine				
Il faut réduire les populations de mouches, de rongeurs (rats, souris) et d'oiseaux (pigeons, corneilles, moineaux, hirondelles, goélands).	**R**	**R**	**R**	☐
7.3 Cadavres				
Le troupeau ne doit pas entrer en contact avec les cadavres d'animaux qui doivent être éliminés rapidement (selon la réglementation provinciale et municipale en vigueur).	**R**	**O**	**O**	☐
Les charognards (chiens, coyotes, renards, corneilles, goélands, éperviers et aigles) ne doivent pas avoir accès à ces cadavres.	**R**	**O**	**O**	☐
8. RECOMMANDATIONS DIVERSES				
Les propriétaires doivent s'assurer du contrôle des déplacements des animaux de compagnie pour éviter toute possibilité de contamination indirecte de son troupeau de statut supérieur par ceux-ci (ou tout autre animal pouvant circuler dans les aires d'élevage).	**R**	**O**	**O**	☐
Le médecin vétérinaire praticien doit aviser le CEPOQ et son médecin vétérinaire de toute problématique qui n'est pas décrite dans ce document et pouvant mettre en danger le statut du troupeau de son client.	**R**	**O**	**O**	☐

Je certifie que les renseignements fournis dans le présent document sont exacts.

Propriétaire du troupeau : _____ _____

(Caractères d'imprimerie) (Signature)

Je certifie avoir revu avec le(s) propriétaire(s) chacun des éléments de biosécurité et m'être assuré(e) qu'ils sont compris et appliqués

Médecin vétérinaire : _____ _____

(Caractères d'imprimerie) (Signature)