



La Question du *PublicOvin* répondue par l'équipe du CEPOQ



Question. Que doit-on savoir quand on planifie faire l'aménagement d'une zone dédiée à l'allaitement artificiel?

Tout d'abord, vous devez évaluer le nombre d'agneaux en moyenne qui nécessiteront une supplémentation en lait selon votre régie ou encore la prolificité de vos brebis pour ensuite déterminer la façon dont le lait sera distribué à ceux-ci. Il y a plusieurs possibilités allant de la distribution du lait au biberon à la main dans les parcs de lactation, jusqu'à se procurer une louve artificielle installée dans une salle d'allaitement, en passant par le support à biberons ou la chaudière à tétines.

Si vous choisissez l'allaitement contrôlé, les agneaux devraient recevoir idéalement 4 repas par jour de lait servi tiède (40°). Moins de 4 repas par jour risque de réduire le GMQ. Dans ce cas, si le lait est servi dans une chaudière à tétines, assurez-vous d'avoir une tétine pour chaque agneau.

Si vous choisissez l'allaitement libre-service, vous devrez choisir la chaudière à tétines, la rampe nourricière ou la louve artificielle qui vous convient le mieux. Le nombre d'agneaux mis à l'allaitement artificiel pourra vous guider dans votre choix, car ces trois options n'ont pas du tout le même coût d'achat. Si vous choisissez la chaudière à tétines, prenez en considération le coût des tétines que vous devrez acheter qui vont avec la chaudière. Sachez qu'il est aussi possible de faire soi-même la chaudière à tétines. Ça réduit le coût d'achat et vous avez le choix du modèle des tétines et de la grosseur de la chaudière. Dans le cas de l'allaitement libre-service, 1 tétine pour 4 à 5 agneaux sera suffisant puisqu'ils auront du lait à volonté.

Si vos agneaux sont placés dans une salle d'allaitement artificiel, aménagez cet espace pour que ce soit

facile à laver et à désinfecter entre chaque groupe d'agneaux. Ayez une bonne ventilation et prévoyez un espace pour mettre le frigo, l'armoire à médicaments ainsi qu'un évier avec un comptoir facilement nettoyable. Assurez-vous aussi qu'il y ait suffisamment d'espace dans chaque parquet jusqu'au sevrage. Prévoir 4 agneaux/m² et un maximum de 15 agneaux/parquet. Une densité animale trop élevée pourrait augmenter le risque de transmission de maladies. Assurez-vous aussi qu'il y ait de l'eau fraîche à volonté en tout temps. Priorisez les bols à flotte plutôt que ceux à poussoir, car certains agneaux ont plus de difficulté à s'hydrater suffisamment avec ces derniers. Vous devrez aussi fournir aux agneaux du foin et de la moulée de qualité à volonté et ce dès leur arrivée dans la salle d'allaitement artificiel. Les agneaux seront sevrés, vers l'âge de 30 à 35 jours, comme s'ils étaient sous la mère, c'est-à-dire qu'on doit retirer les sucres le moment venu. Ils devront toutefois avoir atteint un poids minimum de 12-13 kg et consommer suffisamment de concentrés, soit au moins 200g/jour.

Sachez que les besoins en lait de chaque agneau varient, mais en général, l'agneau nourri uniquement à l'allaitement artificiel consommera entre 10 et 13 kg de poudre de lait jusqu'au sevrage. Vous pourrez voir avec votre conseiller pour le choix du lait, car il en existe plusieurs sortes et plusieurs façons de le servir; acidifié ou non, tiède ou froid. Pour vous assurer d'avoir un faible taux de mortalité, voyez avec votre conseiller ou vétérinaire tous les conseils qu'il pourra vous donner pour bien réussir vos agneaux élevés à l'allaitement artificiel avec le moins de maladies possible. ■

Voici le lien vers notre fiche technique sur l'allaitement artificiel : <https://cutt.ly/R17Ooav>

Vous avez une question pour l'équipe du CEPOQ ?

Nous tenons à remercier les producteurs pour leur implication en nous soumettant leurs questions sur l'élevage des ovins. Si vous avez des interrogations sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous en faire part en vous rendant sur le : <https://bit.ly/3x2Dc8x>