

Qualité du lait

Produire du lait de qualité à l'année est un défi quotidien ! Témoignage de producteurs convaincus

Sylvie Girard, productrice
Raynald Dubé, producteur

Avec la collaboration : Dre Line Simoneau
Médecin vétérinaire à la clinique vétérinaire Centre-
du-Québec inc.

En d'autres mots, cela signifie qu'il faut réussir à maintenir un comptage des cellules somatiques sous la barre des 1 500 000 cellules/ml et un compte bactérien sous 321 000 cbi/ml, et ce mois après mois. C'est ce que Sylvie Girard, copropriétaire avec Raynald Dubé, parvient à atteindre. Elle vous partage, avec générosité, quelques pratiques appliquées dans son troupeau.

Bonnes pratiques entourant la traite

- Environnement propre, en tout temps;
- Port de gants jetables lors de la traite;
- Lavage des trayons avec un désinfectant et essuyage individuel avec une serviette de papier propre;
- Pose des trayeuses en évitant les sifflements;
- Retrait automatique bien ajusté pour éviter la surtraite;
- Application d'un bain trayon après la traite;
- Respect de l'ordre de traite suivant :
 - 1ère lactation
 - 2e lactation ou 1ère lactation en lactation prolongée
 - Chèvres matures avec CCS bas
 - Chèvres avec CCS élevé, positive au Staphylococcus ou autre maladies contagieuses (à noter que ce groupe ne représente que 5% du troupeau et seront éliminées ou traitées au tarissement)



" Être bon c'est une habitude, mais être excellent, c'est un choix que l'on fait chaque jour. "

Entretien de l'équipement de traite

- Entretien annuel par le fournisseur (toutes les pièces de caoutchouc sont alors remplacées);
- Remplacement des manchons trayeurs selon la norme du fabricant;
- Vérification des orifices d'entrées d'air de toutes les trayeuses, une fois par semaine;
- Nettoyage du filtre à air du régulateur de vide à tous les 15 jours.

La santé des animaux

- Depuis 2014, le cheptel est exempt d'AEC, présente moins de 5 % paratuberculose et est vacciné annuellement pour contrôler la lymphadénite caséuse.
- Test CMT disponible pour vérifier le lait des femelles présentant un débalancement de pis graduel, une diminution rapide de la production de lait ou un changement de la texture du pis. Si le test soulève un doute, un échantillon de lait est prélevé, congelé et apporté à la clinique vétérinaire pour analyse bactériologique;
- Échantillonnage du lait lors du contrôle laitier permet de suivre l'évolution des CCS de chaque individu au cours de la lactation;
- Lors de la mise-bas, le colostrum des chèvres dont les cellules somatiques sont élevées ou porteuses de Staphylococcus est rejeté. Les chevrettes de remplacement recevront alors du colostrum de remplacement en poudre ou le colostrum d'une autre mère saine;
- Les mâles reproducteurs utilisés proviennent de mères ayant un comptage leucocytaire bas;
- Pour préparer la période de tarissement, soit pendant 1 à 2 semaines, les chèvres reçoivent un minimum de moulée et de fourrage de graminées et sont traitées 2 fois par jour. La monotraite n'est jamais effectuée pendant cette période. Une semaine plus tard, les quartiers sont vidés une dernière fois. Une surveillance quotidienne des pis s'ensuit pendant 7 jours.
- Finalement, il ne faut pas négliger la qualité de l'aliment et de l'environnement.