



La question du PublicOvin répondue par l'équipe du CEPOQ



Est-ce vrai que je ne dois pas couper l'eau aux brebis lors du tarissement?

Marie-Claude Litalien, T.P., tsa, soutien à la recherche et responsable du laboratoire, CEPOQ

Il a longtemps été observé sur le terrain que de restreindre ou même couper l'eau lors du tarissement aidait les brebis à arrêter la production laitière. Eh bien cette pratique n'est pas recommandée, ni nécessaire! Les animaux ne devraient jamais être limités sur la disponibilité en eau d'abreuvement! Il est possible, en faisant une bonne préparation des femelles lors des journées précédant le sevrage, de bien réussir leur tarissement, et ce, sans nuire à leur bien-être. Un manque d'eau peut nuire à la santé générale des brebis, surtout en période de forte chaleur, ainsi qu'au bon fonctionnement du rumen, ce qui augmente les risques de perte de production au sein du troupeau.

Chacun peut avoir sa méthode de tarissement, mais l'essentiel reste de réduire la protéine et l'énergie deux semaines avant ladite journée et de reprendre graduellement une à deux semaines, selon le cas, suivant celle-ci. Selon le plan type de tarissement tiré de la fiche technique « **Le système mammaire** », deux semaines avant le tarissement, commencez à réduire les concentrés de la ration et neuf jours avant le sevrage, arrêtez complètement les concentrés et remplacez le fourrage de haute qualité (< 32 % ADF) par un fourrage de qualité moindre (> 34 % ADF). À sept jours du sevrage, les brebis doivent avoir accès uniquement à du foin de qualité moyenne (> 34 % ADF). Quatre jours avant le sevrage, commencez à remplacer le foin par de la paille et deux jours avant le sevrage, ne servir que de la paille ou du foin très mature. À partir du sevrage, surveillez l'état des mamelles tous les jours et vidangez les glandes trop pleines (dans le cas d'inconfort ou de signes systémiques). Quatre jours après le sevrage, réintroduisez le foin de qualité moyenne (> 34 % ADF) et poursuivez la restriction si vous jugez

que les brebis ont encore du lait. Deux semaines après le sevrage, l'alimentation de préparation aux saillies peut être réintroduite (on débute le flushing!).

Ceci n'est qu'un exemple de plan type de tarissement. Chaque race et chaque type de production sont bien différents et ce plan type de tarissement peut ne pas convenir à votre troupeau.

Ce que vous devez retenir, c'est qu'avec une bonne préparation au tarissement, en réduisant assez tôt les concentrés et les fourrages de qualité, la production laitière réduira suffisamment évitant ainsi de priver les brebis de consommer de l'eau. Assurez-vous d'avoir une litière toujours propre et sèche, car le tarissement est un moment propice à l'entrée et à la multiplication des pathogènes dans le pis. **Il est important d'établir un bon plan avec votre conseiller technique ou nutritionniste afin de préserver vos brebis en santé le plus longtemps possible.** ■

Consultez la fiche technique sur le Système mammaire qui inclut un Plan-type de tarissement :
<https://cepoq.com/wp-content/uploads/2018/09/syst%C3%A8memammairebleed.pdf>.

Nous tenons à remercier les producteurs qui nous soumettent leurs questions sur l'élevage des ovins! Si vous avez des interrogations sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous en faire part à info@cepoq.com ou encore en nous envoyant un message sur notre page Facebook! Retrouvez aussi plusieurs webinaires sur l'alimentation dans la section Formation continue.